

Sintesi e proposta G.U.I.D. A. nella terapia intra-articolare

Alberto Migliore

Gli acidi ialuronici non sono tutti uguali

- ✓ Differiscono per estrazione, concentrazione, MW, volume, indicazione, controindicazione, livello di evidenza,

Nel foglietto illustrativo

- ✓ Numerose differenze
- ✓ Alcune giustificate altre ingiustificate
- ✓ Attenzioni alle indicazioni per la medicina legale
- ✓ Attenzioni alle controindicazioni per la medicina legale
- ✓ Scarsa EBM
- ✓ Bibliografia inappropriata o assente

G.U.I.D.A. nella terapia endoarticolare

- Identificazione del paziente per prodotto per articolazione secondo foglietto ill. e EBM
- Scarse evidenze nelle articolazioni oltre il ginocchio
- La riabilitazione è sinergica alla terapia infiltrativa. Ma bisogna aumentare il livello di EBM ed esplorare la coste effectiveness
- Il consenso informato nella Terapia Infiltrativa deve essere sempre eseguito

osservazioni

- Il placebo IA ha un importante ES sul dolore
- La vs al contrario del placebo ha benefici effetti strutturali
- La vs è efficace nella terapia del dolore da OA di ginocchio
- La vs deve essere un trattamento ciclico e mantiene i suoi effetti nel tempo
- La vs dovrebbe essere iniziata il più precocemente possibile nel corso della malattia
- Ulteriori studi, ben disegnati, sono necessari per aumentare l'EBM della VS

Conclusioni: quesiti aperti

- Il diverso peso molecolare dell'acido ialuronico utilizzato, identifica veramente l'acido ialuronico più o meno efficace?
- Qual é la dose corretta concentrazione in mg per saturare tutti i ricettori all'interno dell'articolazione?
- Quale prodotto é più adeguato nelle diverse fasi della malattia artrosica?
- La fase iniziale, la fase intermedia e quella finale possono avvalersi dello stesso tipo di VS?
- Quali sono i fattori predittivi per ogni specifico acido ialuronico?
- Quale é la potenzialità di una sequenza nei trattamenti con acido ialuronico?
- Un paziente che non risponde a un tipo di acido ialuronico di un determinato peso molecolare, potrebbe rispondere ad un altro tipo di acido ialuronico di diverso peso molecolare?